



## Patienteninformation COVID-19 -Testung

- Es ist momentan wichtig Infizierte frühzeitig zu erkennen, um eine unkontrollierte Verbreitung zu verhindern.
- Eine verlässliche Unterscheidung zwischen COVID-19-Erkrankungen anderen Infektionskrankheiten ist ohne Abstrich nicht möglich!<sup>1</sup>
- Keine Abstrich-Abnahme ohne Schutzausrüstung!

### Schnelltest beim Hausarzt

#### alle Erkrankten

- mit Zeichen einer Atemwegsinfektion
- oder mit Verlust von Geruchs- oder Geschmackssinn<sup>2 3</sup>

und Erkrankte bei denen die Ursache unklar ist:

- mit Fieber, Kopf- oder Gliederschmerzen, Magendarmbeschwerden, neurologischen Beschwerden oder Hautausschlägen<sup>4</sup>

#### Testschema

- 1. Untersuchung sofort bei Krankheitsbeginn,
- negative Resultate ev. nach 48h kontrollieren!
- Hat der/die HausärztIn dennoch einen COVID-19-Verdacht kann zusätzlich einen PCR-Test veranlasst werden.<sup>5</sup>
- Positive Befunde: Bestätigung durch PCR (1450)
- nicht erforderlich bei Kontaktpersonen eines bestätigten Falles

### PCR-Test über 1450

- Personen mit ungeschütztem 15 min face-to-face-Kontakt zu einem COVID-19-Erkrankten, auch wenn sie keine Symptome haben!

#### Testschema

- Tag 1 nach Ermittlung als Kontaktperson
- und zusätzlich 5-7 Tage nach dem ersten Kontakt<sup>6</sup>

<sup>1</sup> [DEGAM-Handlungsempfehlung Version 14 S: 5](#)

<sup>2</sup> [RKI Testkriterien: „bei ALLEN Patienten unabhängig von Risikofaktoren“ S: 8](#) der [Algorithmus nach ÖGKJ](#), Testung nur wenn Angehörige mit RF im selben Haushalt leben, oder bei Kindern mit Fieber >38° sollte nur in Regionen mit grüner Corona-Ampel angewandt werden [Testkriterien symptomatische Kinder <10 Jahre](#)

<sup>3</sup> [Testkriterien des Robert-Koch-Institutes S: 8](#)

<sup>4</sup> [DEGAM-Handlungsempfehlung Version 14](#)

<sup>5</sup> [Österreichische Teststrategie SARS-CoV-2 Version vom 13.10.2020 S: 14](#)

<sup>6</sup> [Testkriterien des Robert-Koch-Institutes](#)

