

Indikation	Präparate	Dosierung	Applikation	
Schmerztherapie				
Viszerale Schmerzen und Weichteilschmerzen	Novalgin® Metamizol	4-5x MTD 6g	p.o., i.v.	
	Mundidol®, Vendal®	Beginn 5-10mg	Oral, iv, sc	
	Hydal® 8 mg = 60 mg Vendal	Beginn 2x2mg	p.o., s.c., i.v.	
	Fentanyl 25mcg = 8mg Hydral	Beginn 25mcg	transdermal	
neuropathischer Schmerz	OxyContin®, Oxynorm®	Beginn 2x 10mg	s.c., i.v., p.o.	
Morphinunverträglichkeit	Heptadon®	Beginn 5-10mg	s.c., i.v.	
Vorhersehbare Schmerzspitzen	Vendal® orale Lösung	1/6 der Tagesdosierung	p.o.	
Schmerzen Dauerinfusion	Mundidol®, Vendal®	Initial 1/3 der vorher oral verabreichten Tagesdosis	s.c., p.o.	
Koliken, intestinale Obstruktion	Buscopan®	60 - 120 mg/d	s.c., i.v., p.o.	
Ko-Analgetika bei Schmerzen mit Teilresponse auf Opioide	Amitryptilin (Saroten®) abends, weil sedierend	z.B. 50 mg	p.o.	
Dyspnoe (4-stündlich)				
1. Stufe	Vendal®	2,5 mg – 10 mg	p.o., s.c., i.v.	
2. Stufe	Vendal® + Temesta® oder	1mg	p.o.	
	Vendal® + Temesta expidet®	1,25 – 2,5	s.l.	
3. Stufe	Vendal® + Dormicum®	1 – 2,5mg	sc, im, iv	
4. Stufe	Vendal® + Dormicum® + Nozinan®	2,5mg	i.v.	
Palliative Sedierungstherapie				
	Dormicum® (nur bei Delir oder Agitation zus. Nozinan®)	0,5 - 2 mg/h 12,5 - 25 mg MTD 300mg	s.c., i.v. i.v.	